MAPS

127

SEPARATNI OTISAK
IZ
„GLASNIKA ZEMALJSKOG MUZEJA U BOSNI I HERCEGOVINI"
XLII. 1930. 1. (Str. 133.—140.)

OPERA INSTITUTI PHYTOPATHOLOGICI BRUNAE (BRNO IN ČECHOSLOVAKIA),
№ 105.

IMPERIAL ... INSTITUTE
22 DEC. 1931

ADDITAMENTUM
AD
FLORAM JUGOSLAVIAE MYCOLOGICAM II

ALIQUOT INVENTIS EX TERRIS PROPINQUIS ADDITIS.

AUCTORE

Dr. RICHARD PICBAUER
(BRNO).

SARAJEVO.
DRŽAVNA ŠTAMPARIJA.
1930.

R.A.M.

OPERA INSTITUTI PHYTOPATHOLOGICI BRUNAE (BRNO IN ČECHOSLOVAKIA),
№ 105.

Additamentum ad floram Jugoslaviae mycologicam II.

aliquot inventis e terris propinquis additis[1])

Auctore Dr. **Rich. Picbauer** (Brno).

Hoc additamento fungi jugoslavici, quos cl. dom. KARLO MALÝ praecipue in Bosna, Hercegovina ac in Dalmatia legit, adnotantur. Multos fungos in his terris etiam cl. dom., V. LOSCHNIGG legit, quae res semper separate s gnificatur. Similiter fungi, quos cl. dom. Ing. AUG. KALANDRA nonnullis locis Romaniae ac Bulgariae legit, separate significantur. His dominis, qui hoc modo de Jugoslaviae exploranda flora mycologica magnopere meriti sunt, hoc loco maximas gratias agere meum gratum est. Aequo modo cl. dom. K. MALÝ, qui correcturam adiuvit, maximas gratias ago.

Myxomycetes.

Diderma spumaroides Fr. Ad ramulos in iugo Trebević, montis ad Sarajevo.
Trichia favoginea (Batsch.) Pers. Ad caudices in abietis prope Stambulčić.

Phycomycetes.

Albugo candida (Pers.) Kuntze. Ad folia viva *Armoraciae lapathifoliae* in horto botanico in Sarajevo.

Capsellae bursae pastoris ad Sarajevo.

Cardaminis sp. Ad viam e monasterio Rilo a Čamkorie in Bulgaria (leg. Ing. Kalandra).

Sinapsis arvensis in agris ad Sarajevo (Malý), ad Nemila (Loschnigg).

Erysimi silvestris (Cr.) Kern. in Gradiště monte pr. Sarajevo.

Cardaminis hirsutae L. In angustiis Razdolina pr. Dobrun.

Peronospora cardamines laciniatae Gäum. Ad folia viva *Cardaminis savensis* Schultz. in silva vetustissima in Zvijezda Planina ad Vareš (leg. Loschnigg).

Plasmopara nivea (Ung.) Schröt. In foliis *Angelicae sp.* in angustiis Prača fl. prope Banja Stijena.

Pseudoperonospora humuli Myabe et Takah. Ad folia *Humuli lupuli* in silva ad Periprava pr. Vilkov in delta Danubii fl. Romaniae (leg. Ing. Kalandra), ad stationem viae ferreae in Halmei ad confines Romaniae (leg. Doc. Dr. Baudyš).

[1]) Vide Glasnik zem. Muzeja XLI (1929) str. 29—34.

Ascomycetes.

Protomyces macrosporus Ung. In foliis petiolisque *Laserpitii marginati* W. K. In graminosis silvarum Bukovik, montis pr. Sarajevo, in Jablan Dol in Treskavica Planina.

Taphrina alni incanae (Kühn.) Magn. In foliis *Alni incani* ad pedem Bucecs, montis ad Brašov Romaniae. (Leg. Ing. Kalandra.)

Taphrina aurea (Pers.) Fr. In foliis *Populi tremulae* ad viam a monasterio Rilo ad Čamkorie versus Bulgariae (leg. Ing. Kalandra).

Sphaerotheca humuli (D. C.) Burr. Ad folia *Humuli lupuli* prope Poetovionem, in horto botanico in Sarajevo.

Sanguisorbae officinalis in monte Stadtberg ad Poetovionem.

Sphaerotheca pannosa Lév. Ad ramulos *Persicae vulgaris* ad Split Dalmatiae (leg. Ing. Pejanović).

Erysiphe galeopsidis D.C. Ad folia *Galeopsidis pubescentis* in dumetis ad Poetovionem.

Phylactinia suffulta (Reb.) Sacc. In foliis *Coryli avellanae* in declivitate montis Ober pr. Nahorevo.

Carpini betuli in valle Koševo pr. Sarajevo.

Microsphaera astragali Sacc. In foliis *Astragali glycyphylli* ad Karčovina prope Poetovionem.

Mycosphaerella maculiformis (Pers.) Schröt. Ad folia quercuum pr. Miljevići ad Sarajevo.

Castaneae sativae ad Gornja Lastva pr. Tivat Dalmatiae (leg. Loschnigg).

Guignardia Bidwelii (Ell.) Viala et. Rav. In ramis *Vitis viniferae* ad Split (leg. Ing. Pejanović).

Guignardia punctoidea (Cooke) Schröt. ad folia *Quercus* lanuginosae ad pedes Velje Brdo, montis ad pagum Popovići Dalmatiae (leg. Loschnigg).

Mycosphaerella punctiformis (Pers.) Schröt. Ad folia quercuum pr. Miljevići ad Sarajevo.

Herpotrichia nigra (Hart.) Ad acus ramulosque *Pini montanae* in Glogov Prenj Hercegovinae (leg. Loschnigg).

Pini pumilionis ad viam a Čamkorie ad Mussala montem versus Bulgariae (Leg. Ing. Kalandra).

Pyrenophora chrysospora (Niessl.) Sacc. In petiolis *Phyteumatis orbicularis* in monte Struga in Crna Gora. Ascis longioribus, 154—174 μ longis ac 23 μ latis, sporis 27—30·7 μ longis ac 13·4 μ latis (leg. V. Hawelka).

Mamiania coryli Ces. et de Not. Ad folia *Coryli avellanae* in dumetis montis Trebević ad Sarajevo.

Coryli colurnae in Domugled, monte ad Balnea Herculanea Romaniae (leg. Ing. Kalandra).

Hypoxylon coccineum Bull. Ad corticem ligni in monte Vrtaljica prope Konjic

Euryachora betulina (Fr.) Schröt. Ad folia *Betulae pendulae* in silvis montis Trebević ad Sarajevo.

Euryachora stellaris Fuck. In foliis *Phyteumatis orbicularis* v. *austriaci* Beck ad Kotlovi Bjelašnica Bosnae.

Phyllachora trifolii (Pers.) Fuck. Ad folia *Trifolii nigrescentis* Viv. In pratis ad Lastva pr. Trebinje Hercegovinae.

Valsa ambiens (Pers.) Fr. Ad ramulos *Rosae caninae* ad rivum Ramiča Banja Potok pr. Sarajevo (leg. Loschnigg).

Rhytisma salicinum (Pers.) Fr. In foliis *Salicis arbusculae* in Vranica Planina.

Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. Ad folia *Aceris monspessulanum* in faucibus Razdolina prope Dobrun, in angustiis Prača fl. prope Banja Stijena.

Aceris obtusati Kit. var. *bosniaci* Malý in monte Igman (Stupnik) prope Sarajevo.

Rhytisma punctatum (Pers.) Fr. Ad folia *Aceris platanoidis* ad pedem montis Lisin pr. Bradina.

Aceris tatarici in monte Matjaševo Brdo pr. Reljevo.

Lophodermium macrosporum (Harry) Rehm. Ad acus *Piceae exelsae* in Trebević, monte ad Sarajevo.

Lophodermium pinastri (Schrad.) Chev. Ad folia *Pini halepensis* Mill. ad silvam »Ruškov Dol« pr. pagum Popovići Dalmatiae (leg. Loschnigg).

Clithris quercina (Pers.) Fr. In quercetis ad Miljevići pr. Sarajevo.

Humaria scutellata Fuck. Locis fontosis in Trebević, monte ad Sarajevo.

Helotium citrinum (Hedw.) Fr. In silvis ad Stambulčić ad Gorovići pr. Pod Vitez Bosnae, in silvis sub cacumine Bijela Stijena montis Trebević ad Sarajevo.

Fabraea ranunculi Fr. Ad folia *Ranunculi cassubici* infra Bucecs, monte ad Brašov Romaniae (leg. Ing. Kalandra).

Fabraea saniculae (Wallr.) Rehm. Ad folia *Saniculae europeae* ad viam a monasterio Rilo ad Čamkoria versus Bulgariae (leg. Ing. Kalandra).

Coryne sarcoides (Jacq.) Tul. Ad caudices in monte Igman ad Sarajevo.

Basidiomycetes.

Ustilagineae.

Ustilago ustilaginea (D. C) Liro. In ovariis *Polygoni vivipari* in Bucecs, monte ad Brašov Romaniae (leg. Ing. Kalandra).

Ustilago panici miliacei (Pers.) Wint. In ovariis *Panici miliacei* in horto botanico in Sarajevo.

Ustilago violacea Pers. In antheris *Dianthi microlepidis* in monte Mussala in Rila Planina Bulgariae (leg. Ing. Kalandra).

Saponariae officinalis ad pagum Glogošnica ad stationem viae ferreae Prenj Hercegovinae (leg. Loschnigg).

Ustilago antherarum Fr. In antheris *Silenis acaulis* in monte Bucecs pr. Brašov Romaniae (leg. Ing. Kalandra).

Ustilago Vaillantii Tul. In antheris *Muscari comosi* ad Ilijaš (leg. Loschnigg).

Tuburcinia hellebori viridis (D. C.) Liro. In foliis *Hellebori odori* W. K. in monte Trebević (Loschnigg), ad pagum Banja Stijena.

Tuburcinia anemones (Pers.) Liro. In foliis *Anemonis nemorosae* in fagetis montis Ivan ad confines Bosnae et Hercegovinae.

Tuburcinia ranunculi (Lib.) Liro. In foliis *Ranunculi sardoi* in Konavosko Polje Dalmatiae.

Uredinales.

Calyptospora Goeppertiana Kühn. In caulibus *Vaccinii vitis idaeae* in Windische Höhe pr. Matschiedl Carinthiae.

Melampsorella caryophyllacearum (D. C.) Schröt. Aecidia ad acus *Abietis albae* in declivibus Hranisava pr. Pazarić.

Melampsora Magnusiana Wagn. In foliis *Populi tremulae* in silvis montis Trebević ad Sarajevo.

Melampsora reticulata Blytt. Aecidia ad folia *Saxifragae aizoidis* in Bucecs, monte ad Brašov Romaniae (leg. Ing. Kalandra).

Melampsora hypericorum (D. C) Schröt. Ad folia *Hyperici androsaemi* in silvis montis Tajan, loco Vresinska Kosa dicto, solo serpentino.

Hyperici sp. in angustiis rivi Miljacka ad fontes Stefanija.

Melampsora euphorbiae (Schub.) Cast. Ad folia *Euphorbiae exiguae* in declivibus saxosis montis Gradac pr. Mihanići.

Melampsora helioscopiae (Pers.) Wint. Ad folia *Euphorbiae Gregersenii* Malý in valle Gostović ad coloniam Kamenica.

Coleosporium petasitidis D. B. Ad folia *Petasitidis hybridi* in Zvijezda Planina ad Vareš (leg. Loschnigg).

Coleosporium tussilaginis (Pers.) Kleb. Ad folia *Tussilaginis farfarae* in valle Prača ad Sietlina.

Coleosporium melampyri (Reb.) Kleb. Ad folia *Melampyri Hoermanniani* Malý in valle Fojnica ad Kiseljak (Loschnigg).

Coleosporium inulae (Kunze) E. Fisch. Ad folia *Inulae candidae* (Ell.) Cass. In angustii Narontis fl. pr. Prenj.

Coleosporium campanulae (Pers.) Lév Ad folia *Trachelii rumelici* ad monasterium Bačkov pr. Stanimaka Bulgariae (leg. Ing. Kalandra).

Campanulae hercegovinae Deg. et Fiala in saxosis faucibus Glogošnica (Prenj planina). Leg. Loschnigg.

Ochrospora sorbi (Oud.) Diet. Aecidia in foliis *Anemonis nemorosae* in faucibus Rakitnica pr. Dubočani.

Melampsora ribesii-purpureae Kleb. Ad folia *Salicis purpureae* in angustiis Miljacka fl.

Uromyces astragali (Opiz.) Sacc. Ad folia *Astragali glycyphylli* f. *bosniaci* Beck. secus rivum Bistrica in m nte Trebević ad Sarajevo.

Uromyces genistae tinctoriae (Pers.) Wint. Ad folia *Cytisi hirsuti* in monte Veliki Žep.

Uromyces thapsi (Opiz.) Bub. Ad folia *Verbasci pannosi* ad Cluj Romaniae, in Vitoša Planina Bulgariae (leg. Ing. Kalandra).

Verbasci sp. in faucibus Prača pr. Banja Stijena.

Uromyces inaequialtus Lasch. Ad folia *Silenis nutantis* infra Bucecs, monte ad Brašov Romaniae (leg. Ing. Kalandra).

Uromyces erythronii (D. C.) Pass. Ad folia *Erythronii dentis canis* in declivibus Trebević, montis ad Sarajevo.

Uromyces sublaevis Tranzsch. Ad folia *Euphorbiae montenegrinae* (Bald.) Malý in cacumine montis Tajan prope Kamenica.

Uromyces excavatus (D. C.) Lév. Ad folia *Euphorbiae polychromae* Kern. In monte Igman pr. Sarajevo, ad Bačevo in Sarajevsko Polje.

Euphorbiae Gregersenii in silvis promiscuis in valle Gostović pr. Popova Luka solo serpentino.

Puccinia mulgedii Syd. Ad folia *Cicerbitae Pančićii* (Vis.) Beauv. in angustiis fl. Rakitnica pr. Dubočani Hercegovinae.

Puccinia lactucarum Syd. Ad folia *Lactucae sagittatae* in quercetis Mecsek, montfs pr. Quinqueecclesiam Hungariae.

Puccinia gentianae (Strauss) Wint. Ad folia *Gentianae cruciatae* in declivibus septentrionalibus montis Trebević ad Sarajevo.

Puccinia thesii (Desv.) Chaill. Ad folia *Thesii linophylli* infra Bucecs ad Brašov Romaniae (leg. Ing. Kalandra).

Puccinia menthae Pers. Ad folia *Satureiae calminthae* in horto botanico in Sarajevo.

Puccinia punctata Link. Ad folia *Galii veri* in monte Trebević ad Sarajevo.

Puccinia galii silvatici Otth. Ad folia *Galii silvatici* ad Prača.

Puccinia calthae Zopf. Ad folia *Calthae palustris* in Vitoša Planina Bulgariae (leg. Ing. Kalandra).

Puccinia dictyoderma Lindr. Ad folia *Smyrnii perfoliati* ad Ramića Banja Potok prope Sarajevo (leg. Loschnigg).

Puccinia silvatica Schröt. Aecidia ad folia *Senecionis erubescentis* in Vitoša Planina Bulgariae (leg. Ing. Kalandra).

Puccinia petasitidis pulchellae W. Lüdi Ad folia *Petasitidis albae* in silvis pr. Stambulčić.

Puccinia festucae Blowr. Aecidia ad folia *Lonicerae alpigenae* in monte Poovo Brdo pr. Dovlići et in monte Jahorina ad Sarajevo.

Puccinia agrostidis Plowr. Ad folia *Aquilegiae vulgaris* ad Pale, vrelo Miljacke (Loschnigg).

Puccinia cnici oleracei Pers. Ad folia *Cirsii sp.* ad viam a monasterio Rilo ad Čamkoria versus Bulgariae (leg. Ing. Kalandra).

Puccini uralensis Tranzsch. Ad folia *Senecionis nemorensis* ad viam a Čamkoria Mussala montem versus Bulgariae (lng. lng. Kalandra).

Puccinia veronicarum D. C. Ad folia *Veronicae urticaefoliae* ad monasterium Rilo Bulgariae (leg. Ing. Kalandra).

Puccinia aegopodii (Schum.) Link. Ad folia *Aegopodii podagrariae* ad Vareš in Zvijezda Planina; ad Ponikve (Loschnigg).

Puccinia annularis (Strauss) Wint. Ad folia *Teucrii chamaedris* in Propasta ad Torda pr. Cluj Romaniae (leg. Ing. Kalandra), ad Nevesinje in declivibus lapidosis montis Velež Hercegovinae (leg. H. Raap).

Puccinia tragopogi (Pers.) Corda. Ad folia *Tragopogonis orientalis* in pratis ad Sarajevo (leg. Loschnigg).

Puccinia chondrillina Syd. Ad folia *Chondrillae junceae* ad Cârța Șoara in Carpathis Fogaraš Romaniae (leg. Ing. Kalandra).

Gymnosporangium juniperi Link. Ad ramos *Juniperi communis* pr. Dovlići.

Ad folia *Sorbi aucupariae* in angus iis Prača fl. pr. Banja Stijena, in silvis montis Trebević ad Sarajevo.

Gymnosporangium clavariaeforme (Jacq.) Rees. Ad folia *Crataegi oxyacanthae* in horto botanico in Sarajevo.

Crataegi monogynae×oxyacanthae in silvis lucidis montis Trebević ad Sarajevo.

Crataegi monogynae in monte Igman supra pagum Glavogodina.

Crataegi nigrae in horto botanico in Sarajevo,

Gymnosporangium sabinae (Dicks.) Wint. Ad folia et ad ramos *Piri communis* ad Split (Leg. Ing. Pejanović).

Gymnosporangium orientale Syd. Ad folia *Crataegi Inzengae* (Tin.) Bert. Ad Klanac Glogošnica supra stationem viae ferrea Prenj in Prenj Planina Hercegovinae (leg. Loschnigg).

Crataegi monogynae ad Bijelo Polje pr. Mostar Hercegovinae.

Gymnosporangium Malyi Pbr. Ad folia fructusque *Crataegi monogynae* ad Koševo et in declivibus septentr. montis Trebević (Ravne) pr. Sarajevo, ad Bijelo Polje pr. Mostar Hercegovinae.

Phragmidium rosae alpinae (D. C.) Schröt. Ad folia *Rosae pendulinae* in silvis montis Trebević ad Sarajevo, in monte Bjelašica pr. Gacko.

Triphragmium isopyri Moug. et Nestl. In foliis pedicellisque *Isopyri thalictroidis* in silvis vetustissimis in Zvijezda Planina ad Vareš (leg. Loschnigg).

Phragmidium potentillae (Pers.) Wint. Ad folia *Potentillae micranthae* in declivibus saxosis pr. Kralupi-Opašac (Vareš).

Aecidium quadrifidum D. C. Ad folia *Eranthis hiemalis* in hortis ripae sin. ad Usora (leg. O. Reiser).

Aecidium hellebori E. Fisch. Ad folia *Hellebori odori* W. K. ad Rakovac pr. Pale.

Aecidium Euphorbiae Gmel. Ad folia *Euphorbiae myrsinitis* in valle Drežanka pr. Drežnica.

Hymenomycetineae.

Corticium coeruleum (Schrad.) Fr. In faucibus Bregava ad Klepci Hercegovinae lignum obtegens (eg. O. Reiser).

Corticium laeve Pers. Ad lignum *Fagi silvaticae* in monte Ivan ad fines Hercegovinae.

Gloeopeniophora incarnata (Pers.) v. H. et L. Ad corticem *Populi sp.* in monte Trebević ad Sarajevo.

Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr. In abietis pr. Stambulčić.

Trametes gibbosa (Pers.) Fr. Eodem loco.

Polyporus fulvus (Scop.) Fr In abietis ad pagum Borovići pr. Pod Vitez.

Polyporus cristatus (Pers.) Fr. In abietis pr. Stambulčić.

Fomes pinicola (Swartz.) Fr. In abietis ad pagum Borovići pr. Pod Vitez.

Schizophyllum commune Fr. Ad truncos *Aesculi hippocastani* in Sarajevo.

Fungi imperfecti.

Phyllosticta cistina Thüm. Ad folia *Cisti salvifolii* ad Gornja Lastva pr. Tivat in Boka Kotorska (leg. Loschnigg).

Phyllosticta mahoniaecola Pass. In foliis *Mahoniae aquifolii* in horto botanico in Sarajevo (Loschnigg).

Phyllosticta syringae West. In foliis *Syringae vulgaris* in horto botanico in Sarajevo.

Phyllosticta cruenta Kicks. In foliis *Polygonati multiflori* in clivo Domugled ad Balnea Herculanea Romaniae (leg. Ing. Kalandra).

Phoma nebulosa (Pers.) Berk. Ad caules *Oenanthis pimpinelloidis* L. in pratis humidis ad Grbavica prope Sarajevo. Sporis cy indraceo-ellipsoideis, quando pediformibus, quando medio quasi constrictis 7·7—11·5 μ longis ac 3·8—4 μ latis, saepissime 9·6 μ longis. Pycnidiis 38 μ diam., poro 4 μ lato apertis.

Phoma conophila Sacc. Ad squamas strobilorum *Piceae excelsae* in silvis montis Trebević ad Sarajevo.

Phomopsis syringina (Sacc.) Trav. Ad ramos *Syringae sp.* in clivo Domugled, ad Balnea Herculanea Romaniae (leg. Ing. Kalandra).

Sporonema campanulae (D. C.) Petr. Ad folia *Campanulae sp.* in Domugled, colle ad Balnea Herculanea Romaniae (leg. Ing, Kalandra).

Ascochyta arophila Sacc. In foliis *Ari maculati* ad silvam pr. selo Ćekrčići pr. Visoko (Loschnigg).

Diplodina capparidis (Sacc.) Allesch. In ramis *Capparidis rupestris* ad muros vetustos in Dubrovnik Dalmatiae (Loschnigg).

Septoria podagrariae Fuck. Ad folia *Aegopodii podagrariae* in silvis montis Trebević ad Sarajevo.

Septoria tiliae West. In foliis *Tiliae platyphyllos* Scop. var. *tenuifoliae* (Host.) Simonk. In valle Suha ad coloniam Kamenica agri fl. Gostović solo calcareo.

Septoria Kalchbrenneri Sacc. = ***S. euphorbiae*** Kalch. In foliis *Euphorbiae sp.* infra Bucecs, monte ad Brašov Romaniae (leg. Ing. Kalandra). Sporis 30·7—49·5 μ longis ac 1·5—1·9 μ latis.

Septoria Brunaudii Sacc. et Syd. In foliis *Anemonis hortensis* ad silvam Talamba pr. pagum Popovići Dalmatiae (leg. Loschnigg).

Phleospora oxyacanthae Wallr. In foliis *Crataegi Inzengae* Tin. Ad Glogošnica Hercegovinae (Loschnigg).

Crataegi monogynae Jacq. In silvis promiscuis montis Trebević ad Sarajevo.

Hendersonia canina P. Brun. Ad ramulos *Rosae sp.* in monte Igman pr. Sarajevo

Camarosporium oreades (Dur. et Mont.) Sacc. Ad folia *Quercus sp.* in quercetis pagi Močiće ad Cavtat Dalmatiae (Loschnigg).

Leptothyrium monotropae P. Henn. In caulibus *Neottiae nidus avis* in silvis ad Gorovići Bosnae.

Gloeosporium Robergei Desm. In foliis *Carpini betuli* in monte Stadtberg pr. Ptuj.

Pestalozzia funerea Desm. In foliis *Smilacis asperati* ad silvam Talamba pr. pagum Popovići Dalmatiae (Loschnigg).

Ovularia obliqua (Cook.) Sacc. Ad folia *Rumicis crispi* in pratis vallis Miljacka pr. Da Riva (Loschnigg).

Rumicis obtusifolii ad rivum Ramića Banja ad Sarajevo (Loschnigg).

Ovularia primulana Karst. Ad folia *Primulae elatioris* infra monte Bucecs ad Brašov Romaniae (leg. Ing. Kalandra).

Ramularia geranii phaei Mass. Ad folia *Geranii phaei* infra monte Bucecs ad Brašov Romaniae (leg. Ing. Kalandra).

Ramularia plantaginis Ell. et Mart. In foliis *Plantaginis reniformis* Beck. in Treskavica Planina ad Jablan Dol.

Ramularia phyteumatis Sacc. et Wint. Ad folia *Phyteumatis* in Prenj Planina infra Kantar et in Čvrsnica Planina.

Ramularia gei (Ellias) Liro. Ad folia *Gei bulgarici* a Čamkoria Mussala montem versus Bulgariae (leg. Ing. Kalandra).

Fusicladium dendriticum (Wallr.) Fuck. Ad folia *Mali dasyphyllos* in colle Djeporac Brdo pr. Dobroševići.

Fusicladium radiosum (Lib.) Lind. Ad folia *Populi tremulae* in silvis ad Petruše pr. Kozarovići.

Cladosporium fuscum Link. Ad ramos emortuos *Rosae „Crimson Rambler"* in horto botanico in Sarajevo.

Heterosporium gracile Sacc. Ad folia *Iridis sp.* in Vitoša planina Bulgariae (leg. Ing. Kalandra).

Macrosporium peponicola Rbh. In fructu *Capsici sp.* in horto oeconomico in Beograd.

Cercospora microspora Sacc. In foliis *Tiliae platyphyllos* in faucibus rivi Kasidolski Potok pr. Kobiljdol, ad Vučja Bara pr. Gacko, in valle Suha ad coloniam Kamenica agri fl. Gostović.

Tiliae cordatae in monte Trebević ad Sarajevo.

Tiliae pseudorubrae C. Schn. In silvis Igman (Stupnik), montis pr. Vrelo Bosne.

Cercospora Saccardiana Scalia. Ad folia *Myrti italicae* Mill. in litore maris loco »Vrtac« dicto ad pagum Popovići Dalmatiae.

Fumago vagans Pers. Ad folia *Crataegi monogynae* pr. Dobrunska crkva.

Stysanopsis resinae (Fr.) Ferr. Ad ramos *Iuniperi oxycedri* ad silvam mixtam Ruškov Dol ad pagum Popovići Dalmatiae (Loschnigg).

Vermicularia dematium (Pers.) Fr. Ad folia *Ophiopogonis japonici* in hortis urbanis in Tivat (Loschnigg).